


1. ¿Qué retenedores emplearías en los molares?

- a. Ackers con tope oclusal mesial
- b. Retenedores de acción posterior
- c. Retenedores forjados sin tope oclusal
- d. Ninguna es correcta




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la curva de Von Spee son ciertas?

- a. Compensa las trayectorias incisiva, cuspídea y condílea en el plano sagital
- b. Permite que las superficies oclusales se orienten paralelamente a las cargas musculares
- c. Favorece que el contacto dentario sea máximo en oclusión
- d. Las respuestas a y c son ciertas




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

3. ¿En cuáles de los siguientes casos está indicada la ferulización de implantes?

- a. Relación corona-implante desfavorable
- b. Cantiléver proximal
- c. Las respuestas *a* y *b* son correctas
- d. Ninguna es correcta



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

4. ¿Qué tipo de palanca emula el aparato masticador y cuál sería el punto de apoyo?

- a. Primer género, apoyo: ATM
- b. Tercer género, apoyo: contacto dentario
- c. Primer género, apoyo: contacto dentario
- d. Tercer género, apoyo: ATM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

5. ¿Cómo se llama este retenedor?

a. Circunferencial con brazo retentivo inverso

b. RPI

c. Roach

d. Bonwill



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos			
																									0		0			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante			
																									0		0			
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación			
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100						
																									Prórroga Tiempo		Cancelar Votac.		Avanzar siguiente	

6. ¿Cuáles son las indicaciones de la prótesis híbrida sobre implantes?

- a. Reabsorción maxilar intensa / falta de soporte labial
- b. Disparalelismo de implantes
- c. N° de implantes insuficiente para implantoprótesis fija cementada o atornillada
- d. Todas son correctas



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

7. ¿Qué plan de tratamiento haría usted en el 46? 47 y 45 presentan movilidad Tipo I



- Se realizaría un Perno Muñón Colado y se rehabilitaría con una corona.
- Se extraería el 46 y realizaría una prótesis fija dentosoportada de 3 unidades de 47 a 45.
- Se haría extracción y se colocaría un implante para remplazar el 46 dejando el tiempo adecuado para la maduración del hueso antes de colocar el implante.
- Se extraería el 46 haciendo una Prótesis parcial fija de 47 47-46 con este último en cantilever

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

8. Paciente de 45 años viene a nuestra consulta con dos coronas metalcerámicas en 11 y 21 desajustadas a nivel marginal así como una ausencia en el 22 (el hueso en esta zona presenta reabsorción de la tabla vestibular) ¿Qué opciones de tratamiento realizaría?



- Plantearía la extracción del 11 y 21 ya que están desajustados a nivel marginal colocando posteriormente dos implantes en posición 11 y 21 para hacer una prótesis fija implantosoportada de 11 a 22.
- Realizaría una prótesis parcial fija en 23 y 22 en cantilever.
- Repondría las coronas metalcerámicas del 11 y 21 y realizaría una prótesis parcial fija dentosoportada en 23 y 22 en cantilever.
- Repondría las coronas metalcerámicas del 11 y 21 y colocaría un implante para restaurar el 22 siendo esta la opción más conservadora.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin	Inicio	
Prórroga	Votación	Votación	
Tiempo	Cancelar	Avanzar	
	Votac.	siguiente	

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	


10. Dada la situación de los modelos, cual sería el mejor tratamiento para rehabilitar el 36 (ausente)



- a. Haría una prótesis fija dentosoportada de 35 a 37
- b. Colocaría un implante en posición 36 para rehabilitar dicho espacio.
- c. Primero coronaría o haría una intrusión ortodóncica del 26 que está extruido invadiendo el espacio del 36 y a continuación haría una protesis parcial fija en 35 a 37.
- d. Realizaría una protesis parcial fija para rehabilitar el espacio del 36 ya que es facilmente adaptable a la situación superior y no presenta problemas para el paciente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos			
																									0		0			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante			
																									0		0			
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica		Fin Votación		Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo		Cancelar Votac.		Avanzar siguiente	

11. Paciente presenta fractura del 24 (pilar de prótesis fija dentosoportada de 24 a 26) ¿Qué plan de tratamiento sería el más adecuado?




- Si no presenta dolor dejaremos el puente en boca hasta que el paciente refiera problemas.
- Se remueve el puente de 24 a 26 para la extracción del 24 y se vuelve a cementar el puente dejando como único pilar el 26
- Se remueve el puente de 26 a 24 y se hace extracción del 24 fracturado, confeccionando un nuevo puente de 23 a 26 dado que los pilares están en perfecto estado.
- Se remueve el puente de 24 a 26 para hacer la extracción del 24 y reemplazarlo al mismo tiempo de la extracción por un implante para poder realizar un puente de 24 a 26 nuevamente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

12. Tipo de clase kennedy y retenedores que le pondría a un paciente que presenta esta esta situación siendo el estado periodontal favorable.



- Tipo III de Kennedy. Se le colocaría un retenedor circunferencial con tope en mesial del 45 y un akers con tope en distal del 35 y mesial del 38.
- Tipo I de Kennedy. Se pondría un akers con tope distal en el 45 y en 35 y 38 se colocarían circunferenciales.
- Tipo III de Kennedy. Se colocarían retenedores tipo Roach en 45, 35 y 38
- Tipo II de Kennedy. Se colocarían un retenedos akers sin tope en 35 y 45 y un circunferencial sin tope en el 48.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos
																										0	0
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante
																										0	0
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver	Fin	Inicio
																									Gráfica	Votación	Votación
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga	Cancelar	Avanzar
																									Tiempo	Votac.	siguiente

13. Indique la respuesta correcta sobre las complicaciones de la prótesis mixta

- a. Arcada inferior
- b. Antagonista dientes naturales
- c. Extremo libre
- d. Ataches rígidos



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

14. Indique la respuesta correcta sobre la selección de un atache en prótesis mixta.

- a. Atache extracoronario mejor
- b. Atache resiliente en tramo intercalar
- c. Mas complicaciones en ataches rígidos
- d. Atache lo mas pequeño posible.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

15. ¿Cuál no es una indicación de una férula de relajación muscular?


- a. Bruxismo
- b. Luxación discal con reducción
- c. Miospasma
- d. Todas



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos			
																									0			0		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante			
																									0			0		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación			
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente			

16. En los requisitos de una férula Michigan señale la incorrecta.

- a. Guía canina en lateralidad
- b. Mas delgada, mas eficaz
- c. Oclusión céntrica
- d. Contactos en todos los dientes



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos
																										0	0
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante
																										0	0
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver	Fin	Inicio
																									Gráfica	Votación	Votación
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga	Cancelar	Avanzar
																									Tiempo	Votac.	siguiente

17. ¿Qué datos necesitaría para rehabilitar al paciente?

a. Ortopantomografía

b. Escáner

c. Análisis estético

d. Todos



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos			
																									0		0			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante			
																									0		0			
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica		Fin Votación		Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo		Cancelar Votac.		Avanzar siguiente	


A panoramic radiograph (X-ray) of a human jaw, showing the upper and lower teeth and the surrounding bone structure. The image is labeled "Es" in the top right corner.

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

19. Indique cuál de los siguientes fármacos no se utiliza en el tratamiento del dolor temporomandibular agudo :

- a. AINE's.
- b. Diazepam.
- c. Anestésicos locales.
- d. Corticosteroides.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

20. Un paciente portador de prótesis removibles con dimensión vertical disminuida no referirá:

- a. Flacidez muscular.
- b. Dolor muscular y articular.
- c. Mordisqueo al hablar y masticar.
- d. Ruidos al hablar y al comer.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

21. ¿Qué tipo de oclusión le daría a un paciente portador de una prótesis completa en la arcada superior y una prótesis fija atornillada inferior?

- a. Balanceada bilateral.
- b. Mutuamente protegida con guías suaves.
- c. Guía canina en lateralidades.
- d. Respuestas b y c son correctas.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

22. ¿Qué tipo de prótesis removible le realizaría al paciente de las imágenes teniendo en cuenta que presenta movilidad de grado II en los dientes que están restaurados con prótesis fija?

- a. Prótesis mucosoportadas en ambas arcadas.
- b. Mucosoportada superior y de soporte mixto inferior.
- c. Prótesis mixta en ambas arcadas.
- d. Prótesis de soporte mixto en ambas arcadas.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

23. ¿Cómo se puede disminuir el grado de deflexión de prótesis fijas dentosoportadas largas?

- a. Aumentando el tamaño de los conectores en sentido vestibulo-lingual.
- b. Aumentando el tamaño de los conectores en sentido ocluso-gingival.
- c. Empleando estructuras de óxido de circonio en prótesis cerámicas.
- d. Todas son correctas.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

24. Indique cuál de las siguientes recomendaciones es incorrecta tras la instalación de una prótesis inmediata.

- a. Dieta blanda y fría las primeras 48 horas.
- b. Uso de colutorio de clorhexidina pasadas 24 horas de la colocación de la prótesis.
- c. Debe retirar la prótesis cuando llegue a su domicilio.
- d. Instauraremos pauta antibiótica y antiinflamatoria.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

25. Con respecto al tratamiento de carillas, señale la respuesta correcta:



- a. Siempre se cementan con cementos de resina.
- b. Se graban previamente con ácido fluorhídrico.
- c. Deben retirarse los excesos antes de la polimerización total del cemento.
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

26. ¿Por qué no se indican las restauraciones con prótesis fija en casos de tramos edéntulos curvos superiores?

- a. Puesto que en dichos tramos las fuerzas oclusales son desfavorables para la longevidad del puente.
- b. Por la tendencia a abrirse diastemas entre los pilares y los dientes adyacentes.
- c. Por exigir una estructura metálica (conectores y pónicos) excesivamente voluminosa para garantizar su resistencia.
- d. Las prótesis fijas en tramos curvos están indicadas si las condiciones de soporte son favorables.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

27. Si colocamos dos IOI en una mandíbula edéntula ¿Cuál es la función que cumplen en una sobredentadura?

- a. Estabilidad.
- b. Retención.
- c. Soporte.
- d. Todas ellas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

28. ¿Cuál de los siguientes elementos no influye en la determinación del color?


- a. El profesional.
- b. El paciente.
- c. La fuente de luz.
- d. Todos ellos influyen en la determinación del color.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

29. Con respecto al montaje en articulador, ¿en qué posición se montan los modelos de estudio?

- a. Máxima intercuspación.
- b. Relación céntrica.
- c. Puede montarse de las dos maneras.
- d. Depende del caso.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

30. ¿Qué tipo de soporte radicular es el más adecuado para soportar una CRT?

- a. Raíz de gran diámetro.
- b. Raíz de gran longitud.
- c. Que la relación corona raíz sea 2:1.
- d. A + b.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

31. De las siguientes situaciones,
¿Cuál cree usted que no es necesariamente
indicación para la restauración con una CRT?

- a. Caries extensas.
- b. Dientes endodonciados con extensas destrucciones o restauraciones defectuosas.
- c. Dientes fracturados.
- d. Deficiencias estéticas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

32. De las siguientes situaciones, ¿Cuál cree usted que no es indicación para la restauración con una CRT?

- a. Caries extensas.
- b. Dientes endodonciados con extensas destrucciones o restauraciones defectuosas.
- c. Dientes fracturados.
- d. Todos los supuestos son indicaciones de CRT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

33. ¿Qué tipo de bases o sillas se emplean en las clases I y II de Kennedy?

- a. Bases reducidas
- b. Bases recortadas
- c. Bases extendidas
- d. Cualquiera de las anteriores



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

34. ¿Qué material nunca debe ser empleado para tomar impresiones sobre implantes?

- a. Siliconas de adición (pesada y fluida).
- b. Alginato.
- c. Poliéter.
- d. Silicona de consistencia media.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

35. Señale la respuesta **INCORRECTA** acerca de las sobredentaduras:

- a. Son prótesis mucosoportadas e implantoretenidas.
- b. La prótesis puede ser retirada tanto por el paciente como por el profesional.
- c. Son prótesis fijas implantoportadas.
- d. El diseño de la barra debe llevarse a cabo antes de la prueba de dientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos	
0		0	
Tiempo		Restante	
0		0	
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	

36. ¿Cuál considera usted que es el objetivo fundamental de colocar una CRT metálica?

- a. Restaurar la anatomía dental.
- b. Restaurar la estética dental y facial.
- c. Restaurar la función masticatoria.
- d. Todas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

37. ¿Cuándo indicaremos una prótesis fija en un tramo edéntulo curvo superior?

- a. Cuando no existan hábitos parafuncionales.
- b. Cuando podamos ferulizar un número suficiente de pilares para cumplir la ley de Ante.
- c. Cuando el reborde alveolar este bienconservado.
- d. Cuando se cumplan todos los supuestos anteriores.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Participantes		Votos
0		0
Tiempo		Restante
0		0
Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación
Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente

38. En el ajuste oclusal en protrusiva, ¿cual de las siguientes afirmaciones no es cierta?

- a. Se realiza a 3,2 y 1 mm sucesivamente.
- b. Es útil colocar los ángulos de Bennett a cero.
- c. Se tallan las vertientes distales superiores y las mesiales inferiores.
- d. La guía incisal debe separar los sectores posteriores lo más posible.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Participantes		Votos	
																									0		0	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Tiempo		Restante	
																									0		0	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Ver Gráfica	Fin Votación	Inicio Votación	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Prórroga Tiempo	Cancelar Votac.	Avanzar siguiente	